

**Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:**  
**Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:**

## **Erdbeerbaumfalter, *Charaxes jasius***

**(LINNAEUS, 1766)**


Der **Erdbeerbaumfalter** (*Charaxes jasius*) ist ein Schmetterling in der Familie der Edelfalter (Nymphalidae). Er ist der größte europäische Tagfalter.

Die leuchtend dunkelbraunen Flügeloberseiten haben eine breite gelbbraune Randbinde und gleichfarbige Flecken in der Postdiskalregion.

Auf den Oberseiten der mit je zwei Spornen (Schwänzchen) versehenen Hinterflügel befindet sich eine Reihe blauer Flecken.

Die Unterseite ist stark mit Streifen und Flecken gemustert. Das Weibchen ist etwas größer als das Männchen und erreicht eine Vorderflügelänge von über 40 mm und eine Flügelspannweite von über neun cm.

**Foto:** Siga



Die Raupen sind grün gefärbt und haben einen hellen, gelblichen Seitenstreifen. Sie leben am Westlichen Erdbeerbaum (*Arbutus unedo*).



Sie besitzen jeweils einen Ruheplatz; dort spinnen sie auf der Mitte der Blattoberfläche ein Gespinst. Zu diesem Ruheplatz, welcher im Laufe der Entwicklung öfters gewechselt werden kann, kehren die Raupen in den Fraßpausen zurück, da sie zum Fressen meist auf andere Blätter wandern.

**Foto:**

*Banco de imágenes del CNICE*

Der Falter liebt und besucht aufgeplatztes, gärendes Obst, Schweiß und auch Exkreme. Im September kann er oft beim Saugen an überreifen, in Gärung übergegangenen Feigen (*Ficus*) oder anderen Früchten beobachtet werden.

Der Erdbeerbaumfalter fliegt in zwei Generationen von Mai bis Juni und von August bis September. Er ist ein guter und schneller Flieger und kann stundenlang beim Flug durch sein Revier beobachtet werden.

Die gelblichen, 2 mm großen Eier werden entweder auf der Unter- oder Oberseite der Blätter abgelegt. Die Raupen verpuppen sich an ihrer Nahrungspflanze. Die grünlich-weiße Puppe ist oval geformt.

Die Verbreitung des Erdbeerbaumfalters ist stark an die Verbreitung des Erdbeerbaums, der Futterpflanze der Raupe, gekoppelt.

Der Erdbeerbaumfalter kommt in den Küstenbereichen des Mittelmeeres bis ins zentrale Afrika vor. In Europa und Nordafrika umfasst die Verbreitung Algerien, Marokko, Tunesien und die Toskana, weiterhin in Frankreich, West-Portugal, die Balearen, Italien, Korfu und **Kreta**.

Er ist meist in halbschattigen Gebieten wie Gebüsch und an Waldrändern anzutreffen. Er kommt aber auch in Siedlungsgebieten vor.

**Siehe dazu auch das Merkblatt 398-12.**